



# Результаты голосований

2019






Соблюдаете ли Вы правило пластики всей области рубца, а не только грыжевых ворот?

72





# Применяете ли Вы лапароскопическую пластику при послеоперационных грыжах?

79




Какую открытую методику протезирующей пластики Вы считаете методом выбора? 78










Передняя  
(Ramirez)






Задняя



Зависит от  
показаний









# Какие виды анестезии при пластике послеоперационных дефектов брюшной стенки Вы предпочитаете?

88




Какой способ послеоперационного обезболивания Вы предпочитаете?

85



Каков Ваш подход к одномоментной коррекции сопутствующих хирургических заболеваний органов брюшной полости при герниопластике?


87



Всегда стремимся к одномоментным операциям




Одномоментно выполняем только абдоминопластику




Разделяем лечение на этапы

# Рекомендуемые сроки ношения эластичного бандажа после протезирующей пластики послеоперационных дефектов передней брюшной стенки...




# Рекомендуемые сроки ограничения интенсивной физической нагрузки после протезирующих пластик послеоперационных грыж?

84



# Анестезия выбора при односторонней паховой грыже (открытая операция)?

83



# Анестезия выбора при двусторонней паховой грыже (открытая операция)?

78






# Методика выбора при операции по поводу односторонней паховой грыжи?

81



24.7 % Lichtenstein



0.0 %  
Пластика  
традиционная  
местными тканями



0.0 % PHS



0.0 % Трабукко



60.5 % TAPP



14.8 % TEP

# Методика выбора при операции по поводу неущемленной бедренной грыжи?

81



Применяете ли Вы лапароскопическую герниопластику единым протезом при двусторонних паховых грыжах? 83



# Существует ли проблема послеоперационной хронической боли?

82



2.4 %

Не существует




40.2 %



Существует



57.3 %

Проблема есть,  
но весьма редка





# Рекомендуемые сроки ограничения интенсивной физической нагрузки после протезирующих паховых пластик?

82

