



hernia-conference.ru

II Всероссийский Съезд Герниологов


Интерактивное голосование

27 октября 2017



Используете ли Вы пластику местными тканями?

1. Нет
2. По показаниям
3. Всегда использую




Voted: 59

0:00

Соблюдаете ли Вы правило пластики всей области рубца, а не только грыжевых ворот?

1. Да
2. Нет
3. Не всегда




Voted: 56

0:00

Применяете ли Вы лапароскопическую пластику при послеоперационных грыжах?

1. Нет
2. Планируем внедрять
3. Применяем по показаниям
4. Считаем методом выбора




Voted: 65

0:00

Какую методику протезирующей пластики Вы считаете методом выбора?

1. ONLAY
2. SUBLAY
3. По В.И. Белоконеву
4. Другие




Voted: 65

0:00

Применяете ли Вы сепарационные пластики?

1. Да
2. Нет




Voted: 63

0:00

Какие методики сепарационной пластики вы используете?

1. Передняя (Ramirez)
2. Задняя (различные варианты)
3. Зависит от показаний




Voted: 49

0:00

Применяете ли вы методику IPOM?

1. Не применяем
2. Применяем открыто
3. Применяем лапароскопически
4. 2 и 3




Voted: 62

0:00

Ушиваете ли Вы грыжевые ворота
(восстанавливаете белую линию)
при лапароскопической пластике
послеоперационных (пупочных)
грыж?


1. Всегда
2. Нет
3. Только при узких
грыжевых воротах
(диастазе)



Voted: 35

0:00

Какие виды анестезии при пластике послеоперационных дефектов брюшной стенки Вы предпочитаете?




Voted: 59

0:00

Какой способ послеоперационного обезболивания Вы предпочитаете?

1. Продленная ЭА
2. Анальгетики внутримышечно



Voted: 62

0:00

Какой классификацией послеоперационных грыж Вы пользуетесь в практической работе?

1. SWR
2. Тоскина-Жебровского
3. Прочие




Voted: 61

0:00

Каков Ваш подход к одномоментной коррекции сопутствующих хирургических заболеваний органов брюшной полости при герниопластике?

1. Всегда стремимся к одномоментным операциям
2. Одномоментно выполняем только абдоминопластику
3. Разделяем лечение на этапы




Voted: 60

0:00

Какие протезы предпочитаете у больных с послеоперационными грыжами?

1. Полипропиленовые
2. Композитные
3. Иные
4. В зависимости от ситуации




Voted: 62

0:00

Рекомендуемые сроки ношения эластичного бандажа после протезирующей пластики послеоперационных дефектов передней брюшной стенки...

1. Не рекомендуем бандаж
2. 1 месяц
3. 3 месяца
4. До года
5. Постоянно




Voted: 61

0:00

Рекомендуемые сроки ограничения интенсивной физической нагрузки после протезирующих пластик послеоперационных грыж?

1. Нет ограничений
2. 3 месяца
3. 6 месяцев
4. До года




Voted: 58

0:00

Анестезия выбора при односторонней паховой грыже (открытая операция)?

1. ЭТН
2. ВВ
3. СМА
4. МА




Voted: 61

0:00

Анестезия выбора при двусторонней паховой грыже (открытая операция)?

1. ЭТН
2. ВВ
3. СМА
4. МА




Voted: 60

0:00

Методика выбора при операции по поводу односторонней паховой грыжи?

1. Lichtenstein
2. Пластика традиционная местными тканями
3. PHS
4. Трабукко
5. TAPP
6. Внебрюшинная эндоскопическая




Voted: 52

0:00

Методика выбора при операции по поводу бедренной грыжи?

1. Модифицированная Lichtenstein
2. Руджи
3. Парлавеччо
4. Эндоскопически




Voted: 55

0:00

Применяете ли вы лапароскопическую герниопластику единым протезом при двусторонних паховых грыжах?

- 1. Да
- 2. Нет




Voted: 43

0:00

Существует ли проблема послеоперационной хронической боли?

1. Не существует
2. Существует
3. Проблема есть, но
весьма редка




Voted: 60

0:00

Метод выбора при паховой грыже в 18-20 лет?

1. Shouldice
2. Lichtenstein
3. Эндоскопически
4. Другие пластики местными тканями




Voted: 59

0:00

Метод выбора при паховой грыже у женщин?

1. Shouldice
2. Lichtenstein
3. Эндоскопически
4. Другие пластики местными тканями




Voted: 61

0:00

Отношение к консервативному лечению паховых грыж?

1. Никогда
2. Возможно при отсутствии жалоб и симптоматики
3. Только при невозможности оперировать по различным причинам
4. 2 и 3




Voted: 61

0:00

Рекомендуемые сроки ограничения интенсивной физической нагрузки после протезирующих паховых пластик?

1. Нет ограничений
2. 1 неделя
3. 1 месяц
4. 2 месяца
5. Больше 2 месяцев



Voted: 60

0:00

ГОЛОСОВАНИЕ ОКОНЧЕНО