

1. Используете ли Вы пластику местными тканями?


1. Нет



2. По показаниям



3. Всегда использую



2. Соблюдаете ли Вы правило пластики всей области рубца, а не только грыжевых ворот?

1. Да



2. Нет



3. Не всегда



3. Применяете ли Вы лапароскопическую герниопластику?

1. Нет



2. Планируем внедрять



3. Применяем по показаниям



4. Считаем методом выбора



4. Какую методику протезирующей пластики Вы считаете методом выбора?

1. ONLAY

10.1%

2. SUBLAY

67.7%

3. По В.И.Белоконеву

13.1%

4. Другие

9.1%



5. Частота использования методики Ramirez?

1. Не используем



2. Не используем, но собираемся



3. Опыт < 10 операций



4. Опыт < 50 операций



5. Опыт > 50 операций



6. Считаете ли Вы правильным утверждение, что методика INLAY при послеоперационных грыжах должна быть вытеснена методикой типа Ramirez?

1. Правильно



2. Неправильно



7. Применяете ли вы методику IPOM?

1. Не применяем



2. Применяем



8. Какие виды анестезии при пластике дефектов брюшной стенки Вы предпочитаете?

1. Всегда сбалансированная анестезия с ИВЛ

37.1%

2. Всегда спинальная анестезия

4.8%

3. Чаще сбалансированная анестезия с ИВЛ

26.7%

4. Чаще спинальная и эпидуральная анестезия с ИВЛ

31.4%



9. Какой способ послеоперационного обезболивания Вы предпочитаете?

1. Продленная ЭА



2. Анальгетики внутримышечно



10. Какой классификацией послеоперационных грыж Вы пользуетесь в практической работе?

1. SWR



2. Тоскина-Жебровского



3. Прочие



11. Каков Ваш подход к одномоментной коррекции сопутствующих хирургических заболеваний органов брюшной полости при герниопластике?

1. Всегда стремимся к одномоментным операциям

87.5%

2. Одномоментно выполняем только абдоминопластику

7.7%

3. Разделяем лечение на этапы

4.8%



12. Какие протезы предпочитаете у больных с послеоперационными грыжами?

1. Полипропиленовые

56.8%

2. Композитные

9.9%

3. Иные

2.7%

4. В зависимости от ситуации

30.6%



13. Анестезия выбора при односторонней паховой грыже (открытая операция)?

1. ЭТН

3.7%

2. ВВ

5.6%

3. СМА

62.0%

4. МА

28.7%



14. Анестезия выбора при двусторонней паховой грыже (открытая операция)?

1. ЭТН

8.4%

2. ВВ

5.6%

3. СМА

76.7%

4. МА

9.3%



15. Методика выбора при операции по поводу односторонней паховой грыжи?

1. Lichtenstein



2. Пластика традиционная местными тканями



3. PHS



4. Трабукко

0.0%

5. TAPP



6. Внебрюшинная эндоскопическая



16. Методика выбора при операции по поводу бедренной грыжи?

1. Модифицированная Lichtenstein

52.7%

2. Руджи

13.9%

3. Парлавеччо

9.3%

4. Эндоскопически

24.1%



17. Существует ли проблема послеоперационной хронической боли?

1. Не существует



2. Существует



3. Проблема есть, но весьма редка



18. Метод выбора при паховой грыже в 18-20 лет?

1. Shouldice

35.8%

2. Lichtenstein

18.3%

3. Эндоскопически

31.2%

4. Другие пластики местными тканями

14.7%



19. Метод выбора при паховой грыже у женщин?

1. Shouldice

13.1%

2. Lichtenstein

34.6%

3. Эндоскопически

32.7%

4. Другие пластики местными тканями

19.6%



20. Отношение к консервативному лечению паховых грыж?

1. Никогда

38.0%

2. Возможно при отсутствии жалоб и симптоматики

6.5%

3. Только при невозможности оперировать по различным причинам


55.5%

4. Другие пластики местными тканями

0.0%



21. Рекомендуемые сроки ограничения интенсивной физической нагрузки после протезирующих пластик?



Считаете ли Вы полезным проведение «Школы герниолога»

1. Ответ «Да»

97.8%

2. Ответ «Нет»

2.2%

0.0%

